

Doğumsal Brakiyal Pleksus yaralanması, boyun bölgesindeki omurlardan çıkıp kolun sinirlerini oluşturan örgünün (pleksusun) zedelenmesi olarak tanımlanıyor. Oluşan hasar; kürek kemiği, omuz ve kol kaslarını etkiliyor. Bu vakalarda umut mikrocerrahi yöntemle sinir transferi ve kas transferleri

gul.kireklo@sabah.com.tr

## GÜL KİREKLO İLE SAĞLIKLI YAŞAM



Doğumsal Brakiyal Pleksus yaralanması, boyun bölgesi omurlardan çıkıp kolun sinirlerini oluşturan (pleksusun) zedelenmesi olarak tanımlanıyor. Oluşan kürek kemiği, omuz ve kol kaslarını etkiliyor. Bu vakada umut mikrocerrahi yöntemle sinir transferi ve kas tran-

# DOĞUMSAL YARALANMALAR

## SİNİR VE KAS TRANSFERİ

**D**oğum sırasında çeşitli nedenlerle bebeğin omuzunun doğum kanalına sıkışması sonrası boyundan gelen sinir-



layan Prof. Dr. Özçelik, aynı zamanda hekimin tecrübesinin de bir o kadar önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Özçelik, "Eğer hastalarda"

[Haberini okumak için tıklayın.](#)